F&B Divosan Viragri Plus VT97

Desinfetante não oxidante com eficácia virucida

Descrição

Viragri Plus Plus é um desinfetante não oxidante muito eficaz, especialmente formulado para aplicação na agricultura e pecuária mas também para aplicações especificas na indústria alimentar e de bebidas.

Propriedades

- **Viragri Plus** é uma formulação à base de glutaraldeído e compostos de amóniob quaternário (QAC) em solução aquosa. Testada intensivamente em laboratório e nob terreno, demonstrou ter largo espectro de atividade contra bactérias e vírus relevantes nab manutenção eficaz da higiene e saúde animal.
- **Viragri Plus** é um desinfetante terminal para uso em superfícies previamente bem limpasb e enxaguadas, de forma a conseguir a remoção de toda a sujidade.
- **Viragri Plus** está também recomendado para utilização em habitáculos de animais,b equipamentos desmontáveis e lava-botas, podendo ser utilizado em todas as superfíciesbe equipamentos encontrados nas instalações de criação animal e incubadoras.
- **Viragri Plus** é indicado para aplicação manual, imersão, pulverização ou nebulização.

Benefícios

- Especialmente formulado para aplicação nas indústrias agro-alimentares, especialmente produção pecuária (grandes e pequenos ruminantes mas também na suinicultura eb avicultura.
- Ação bactericida, fungicida e virucida.
- Produto de baixa corrosividade, indicado para uso em todas as superfícies incluindo ligas leves.
- Eficaz em águas macias e duras.

Instruções de Utilização

Viragri Plus é usado de utilizado:

- Instalações de estabulação animal: pulverizar com solução a 0,5-1% v/v
- Equipamento de contenção animal e equipamentos amovíveis de uso na pecuária e agricultura: pulverizar ou mergulhar numa solução a 0,5-1% v/v
- Lava botas/pedilúvios/rodilúvios: usar uma solução a 1-2% v/v, mudar diariamente
- Pedilúvios animais/imersão de cascos: preparar solução/banho a 3%, para bovinos, ou a 2% para ovinos e ou caprinos; Trocar o banho a cada 200 passagens, para bovinos, ou ab cada 100 para ovinos e ou caprinos passagens. Deixar os animais em terra firmebdurante 30 minutos após a aplicação/imersão. Repetir o processo 4 vezes por semanab(por 4-8 semanas). Deixar secar ao ar.

Nebulização de Instalações e ou equipamentos: aplicar 0,5-2 ml por m3 de produto puro, as soluções de aplicação devem ser preparadas de acordo com o fabricante dos equipamentos.

Superfícies que contactam com os géneros alimentícios ser abundantemente enxaguadas após a aplicação. Para mais informações e ou outras recomendações, consultar o técnico da Diversey.



F&B Divosan Viragri Plus VT97

Dados Técnicos

Aspeto	Liquido incolor, transparente, límpido
Densidade específica (20°C)	1,04
pH (produto puro a 20°C)	5,7
Teor em Fósforo	4,5 g/Kg
Teor de Azoto (N)	5,5 g/kg
Carência Química de Oxigénio (CQO)	550 gO2/kg
Os dados acima descritos são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do Controlo de Qualidade de um lote específico.	

Segurança na armazenagem e manuseamento

Armazenar na embalagem de origem fechada, ao abrigo de temperaturas extremas e da luz solar. Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto, é fornecido em separado na Ficha de dados de Segurança.

Compatibilidade do produto

Viragri Plus é seguro em todo o tipo de materiais geralmente encontrados nas indústrias Agroalimentares e na pecuária, quando aplicado nas concentrações aconselhadas. Enxaguar abundantemente das superfícies após utilização (no espaço máximo de 1 hora) por forma a proteger algum tipo de superfícies "duras" mais sensíveis ao ataque quimico e ou evitar que seja ingerido por animais. É recomendado testar individualmente nos materiais antes da utilização prolongada, para a possibilidade de surgirem eventuais incertezas.

Dados Microbiológicos

EN Test	Temp	Sujidade	Indústria	Bactericida	Leveduricida	Fungicida	Virucida
				Concentração Tempo	Concentração Tempo	Concentração Tempo	Concentração Tempo
EN1656	10°C	3g/l; BSA	Food&Beverage - Agri	0,5% v/v em 30 min	N/A	N/A	N/A
EN1657	10°C	3g/l; BSA	Food&Beverage - Agri	N/A	N/A	10% v/v em 30 min	N/A
EN14349	10°C	3g/l; BSA	Food&Beverage - Agri	1 % v/v em 30 min	N/A	N/A	N/A
EN16437	20°C	3g/l; BSA	Food&Beverage - Agri	6% v/v em 30 min	0,5% v/v em 5 min	5% v/v em 30 min	N/A
EN1650	20°C	0,3g/l; BSA	Food&Beverage - Agri	N/A	0,1% v/v em 5 min	N/A	N/A
EN1276	20°C	0,3g/l; BSA	Food&Beverage - Agri	0,5% v/v em 5 min	N/A	N/A	N/A
EN13697	20°C	0,3g/l; BSA	Food&Beverage - Agri	2% v/v em 5 min	0,5% v/v em 15 min	5% v/v em 15 min	N/A
EN14675 **ECBO virus**	20°C	3g/l; BSA	Food&Beverage - Agri	N/A	N/A	N/A	1% v/v 15 min
EN14675 **Avian Influenza**	20°C	3g/l; BSA	Food&Beverage - Agri	N/A	N/A	N/A	0,25% v/v 5 min

Aprovações:

Biocida notificado à Direção Geral de Agricultura e Veterinária (DGAV)

www.diversey.com

© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Revisão V00/2024